肘後備急方/卷7

维基文库 · 免费全文 · CC BY-SA 4.0

←

肘後備急方/卷6

肘後備急方
肘後備急方卷七
作者：葛洪　東晉

肘後備急方/卷8

治為熊虎爪牙所傷毒痛方第五十三

葛氏方，燒青布以熏瘡口，毒即出。仍煮葛根令濃，以洗瘡。搗乾葛根，末，以煮葛根，汁。服方寸匕，日五，夜一。則佳。

又方，嚼粟，塗之，姚同。

又煮生鐵令有味，以洗瘡上，姚同。

凡猛獸毒蟲皆受人禁氣，將入山草，宜先禁之，其經術云。

到山下先閉氣三十五息，存神仙將虎來到吾前。乃存吾肺中有白帝出，把虎兩目塞。吾下部又乃吐肺氣，白通冠一山林之上。於是良久，又閉氣三十五息。兩手捻都監目作三步，步皆以右足在前，乃止祝曰。李耳，李耳，圖汝非李耳耶，汝盜黃帝之犬。黃帝教我問汝，汝答之。云何，畢便行，一山之虎不可得見。若逢之者。目向立，大張左手，五指側之，極勢跳。手上下三度，於跳中大喚，咄虎，北斗君汝去，虎即走。

止宿亦先四向如此，又燒牛羊角，虎亦不敢近人，又搗雄黃，紫石，縫囊貯而帶之。

附方 《梅師方》，治虎傷人瘡。

但飲酒，常令大醉，當吐毛出。

治卒為犬所咬毒方第五十四

療 犬咬人方。

先嗍卻惡血，灸瘡中十壯，明日以去。日灸一壯，滿百乃止。姚云，忌酒。

又云，地榆根，末服方寸匕。日一二，亦末，敷瘡上。生根，搗敷，佳。

又方，刮虎牙，若虎骨，服一匕。已發如 犬者，服此藥，即瘥。姚同。

又方，仍殺所咬犬，取腦敷之，後不複發。

又方，搗薤汁敷之。又飲一升，日三，瘡乃瘥。

又方，末礬石納瘡中裹之。止瘡不壞，速愈，神妙。

又方，頭發， 皮，燒末，水和飲一杯。若或已目赤口噤者，折齒下之。姚云，二物等分。

又方，搗地黃汁，飲之。並以塗瘡，過百度止。

又方，末乾薑，常服，並以納瘡中。

凡 犬咬人，七日一發。過三七日不發，則脫也。要過百日，乃為大免。

每到七日，輒當飲薤汁三二升。又當終身禁食犬肉，蠶蛹食此。發則不可救矣，瘡未瘥之間，亦忌生物。

諸肥膩及冷，但於下蒸魚，及就膩氣中食便發。不宜飲酒，能過一年，乃佳。

若重發療方。

生食蟾蜍，絕良，驗，姚同。亦可燒炙食之，不必令其人知。初得嚙便為之，則後不發。姚剝作 吞，蒜齏下。

又方，搗薑根汁，飲之，即瘥。

又方，服蔓荊汁，亦佳。

又凡犬咬人。

取灶中熱灰，以粉瘡，敷之，姚同。

又方，火炙蠟，以灌瘡中，姚同。

又方，以頭垢少少，納瘡中。以熱牛屎塗之，佳，姚同。

又方， 蓼，以敷瘡上。

又方，乾薑末，服二匕。薑汁服半升，亦良。

又方，但依 犬法，彌佳。燒蟾蜍，及末礬石，敷之，尤佳。

得犬嚙者難療，凡犬食馬肉生狂。

及尋常，忽鼻頭燥，眼赤不食。避人藏身，皆欲發狂。便宜枸杞汁，煮糜飼之，即不狂。若不肯食糜，以鹽伺鼻便。忽塗其鼻，既舐之則欲食矣，神驗。

附方 《梅師方》，治狂狗咬人。

取桃白皮一握，水三升，煎取一升，服。

食療，治犬傷人。

杵生杏仁，封之，瘥。

治卒毒及狐溺棘所毒方第五十五

馬嚙人作瘡，有毒，腫熱疼痛方。

刺雞冠血，瀝著瘡中三下。若 馬用雌雞，草馬用雄雞，姚同。

又方，灸瘡及腫上，瘥。

若瘡久不瘥者。

馬鞭梢，長二寸，鼠屎二七枚。燒末，膏和，敷之，效。

又方，以婦人月經，敷上，最良。姚云，神效。

人體上先有瘡而乘馬，馬汗。若馬毛入瘡中，或但為馬氣所蒸。皆致腫痛煩熱，入腹則殺人。

燒馬鞭皮，末，以膏和，敷上。

又方，多飲淳酒，取醉，即愈。

又剝死馬，馬骨傷人手，毒攻欲死方。

便取死馬腹中屎，塗之。即瘥，姚同。

又方，以手納女人陰中，即愈。有胎者不可，令胎墮。

狐尿棘刺刺人，腫痛欲死方。

破雞，拓之，即瘥。

又方，以熱桑灰汁漬，冷複易，取愈。

《短劇》方，以熱蠟著瘡中，又煙熏之。令汁出，即便愈。

此狐所尿之木，猶如蛇 也，此下有魚骨傷人。

附方 《圖經》云，治惡刺，及狐尿刺。

搗取蒲公草根莖白汁，塗之。惟多塗，立瘥止，此方出孫思邈《千金方》，其序云，余以貞觀五年七月十五日夜，以左手中指背，觸著庭木，至曉遂患，痛不可忍。經十日，痛日深，瘡日高碩，色如熟小豆色。嘗聞長者之論，有此方，遂依治之。手下則愈，痛亦除瘡，亦即瘥。未十日而平複，楊炎南行方，亦著其效云。

效方，治狐尿刺螫痛。

杏仁細研，煮一兩，沸，承熱以浸螫處，數數易之。

《外台秘要》，治剝馬，被骨刺破，中毒欲死。

取剝馬腹中糞及馬尿洗，以糞敷之，大驗，絞糞汁飲之，效。

《聖惠方》，治馬咬人，毒入心。

馬齒莧，湯食之，瘥。

《靈苑方》，治馬汗入瘡。腫痛漸甚，宜急療之，遲則毒深難理。

以生烏頭末，敷瘡口，良久有黃水出，立愈。

王氏《博濟》，治驢涎馬汗毒所傷神效。

白礬飛過，黃丹炒令紫色，各等分。相滾合，調貼患處。

治卒青蛙蝮虺眾蛇所螫方第五十六

葛氏，竹中青蜂螫人方。

雄黃，麝香，乾薑，分等。搗，篩以麝 和之。著小竹管，帶之行。急便用敷瘡，兼眾蛇虺毒之，神良。

又方，破烏雞，熱敷之。

蛇，綠色，喜綠樹及竹上。大者不過四五尺，皆呼為青條蛇人中，立死。

葛氏，毒蛇螫人方。

急掘作坑，以埋瘡處。堅築其上，毒即入土中，須臾痛緩，乃出。

徐玉，治蛇毒方。

用搗地榆根，絞取汁，飲。兼以漬瘡。

又方，搗小蒜飲汁。以滓，敷瘡上。

又方，豬耳垢著瘡中，牛耳中垢亦可用之，良。

又方，嚼鹽唾上訖，灸三壯。複嚼鹽，唾之瘡上。

又方，搗薤，敷之。

又方，燒蜈蚣末，以敷瘡上。

又方，先以無節竹筒，著瘡上，熔蠟，及蜜，等分。灌筒中，無蜜，單蠟亦通。

又方，急且尿瘡中，乃拔向日閉氣三步，以刀掘地，作小坎。以熱湯沃坎中泥作丸如梧子大，服之。並以少泥，泥之瘡上，佳。

又方，桂心，栝蔞，分等為末。用小竹筒密塞之以帶行，卒為蝮蛇，即敷之。此藥療諸蛇毒，塞不密，則氣歇不中用。

一切蛇毒。

急灸瘡三五壯，則眾毒不能行。

蛇毒。

搗鬼針草，敷上，即定。

又方，荊葉，袋貯，敷瘡腫上。

又方，以麝 塗腫上，血出，乃瘥。

又方，以合口椒並葉，搗敷之，無不止。

又方，切葉刀，燒赤，烙之。

附方 《梅師方》，治蛇虺螫人。

以獨頭蒜，酸草，搗，絞敷所咬處。

《廣利方》，治蛇咬方。

取黑豆葉，銼，杵，敷之，日三易，良。

《廣濟方》，治毒蛇嚙方。

菰蔣草根灰，取以封之，其草似燕尾也。

《兵部手集》，主蛇蠍蜘蛛毒。

雞卵輕敲一小孔，合咬處，立瘥。

劉禹錫《傳信方》，治蛇咬蠍螫。

燒刀子頭令赤，以白礬置刀上看成汁，便熱滴咬處，立瘥。此極神驗，得力者數十人，貞元三十二年，有兩僧流向南到鄧州，俱為蛇嚙，令用此法救之。敷藥了便發，更無他苦。

治蛇瘡敗蛇骨刺人入口繞身諸方第五十七

葛氏，凡蛇瘡未愈禁熱食。食便發，療之依初螫人法。

蛇螫人，九竅皆血出方。

取虻蟲初食牛馬血腹，滿者二七枚，燒服之。

此上蛇瘡敗及洪腫法方，蛇螫人，牙折入肉中，痛不可堪方。

取蝦蟆肝，以敷上，立出。

又方，先密取荇葉，當其上穿勿令人見。以再覆瘡口上，一時著葉當上穿，穿即折牙出也。

蛇骨刺人毒痛方。

以鐵精如大豆者，以管吹瘡內，姚同。

又方，燒死鼠，搗，敷之瘡上。

蛇螫人，瘡已合而餘毒在肉中，淫淫痛癢方。

取大小蒜各一升，合搗熱湯淋取汁，灌瘡中，姚同。

蛇卒繞人不解方。

以熱湯淋即解，亦可令就尿之。

蛇入人口中不出方。

艾灸蛇尾即出，若無火以刀周匝割蛇尾。截令皮斷，乃將皮倒脫即出，《短劇》同之。

七八月中，諸蛇毒旺，不得泄。皆嚙草木，即枯死。名為蛇，此物傷人甚於蛇螫，即依蛇之螫法，療之。

附方 《廣利方》，治蛇咬瘡。

暖酒，淋洗瘡上，日三易。

《聖惠方》，治蛇入口，並入七孔中。

割母豬，尾頭瀝血，滴口中，即出。

治卒入山草禁辟眾蛇藥術方第五十八

辟眾蛇方。

同前姚氏仙人入山草法。

辟蛇之藥雖多，唯以武都雄黃為上。帶一塊石，稱五兩於肘間，則諸蛇毒莫敢犯。

他人中者，便磨以療之，又帶五蛄黃丸，良。丸有蜈蚣，故方在於備急中，此下有禁法云，不受而行，則無驗。

中蛇毒勿渡水，渡水則痛甚於初螫。

亦當先存想作大蜈蚣，前已隨後渡。若乘船渡，不作法，殺人。

入山並不得呼作蛇，皆喚為蛇，中之者，彌宜勿誤。

辟蛇法，到處燒羚羊角，令有煙出地，則去矣。

附方 《廣利方》，治諸蛇毒螫人欲死兼辟蛇。

乾薑，雄黃等分。同研，用小絹袋貯，系臂上。男左，女右，蛇聞藥氣逆避，人螫毒，敷之。

治卒蜈蚣蜘蛛所螫方第五十九

葛氏方，割雞冠血，塗之。

又方，以鹽緘瘡上，即愈。云蜈蚣去遠者，即不複得。

又方，鹽熱，漬之。

又方，嚼大蒜，若小蒜，或桑樹白汁塗之。亦以麻履底土，揩之，良。

蜈蚣甚嗡人，其毒殊輕於蜂。當時小痛而易歇，蜘蛛毒亦療。

生鐵衣，醋研，取濃汁，塗之。又烏麻油，和胡粉，敷上。乾複易，取瘥，取羊桃葉，敷之，立愈。

附方（蚯蚓螻蛄蠶咬蠷 尿，及惡蟲咬人附）《梅師方》，治蜈蚣咬人，不止。

獨頭蒜，摩螫處，痛不止。

又《經驗後方》，燒雞屎，酒和，敷之，佳。又取雞屎和醋，敷之。

《聖惠方》，治蜈蚣咬方。

用蝸牛擦取汁，滴入咬處。

《兵部手集》，治蜘蛛咬，遍身成瘡。

取上好春酒飲醉，使人翻不得，一向臥。恐酒毒腐人，須臾蟲於肉中，小如米，自出。

又《譚氏小兒方》，以蔥一枝，去尖，頭作孔。將蚯蚓入蔥葉中，緊捏兩頭，勿泄氣。

頻搖動即化為水，點咬處，瘥。

劉禹錫《傳信方》，治蟲豸傷咬。

取大藍汁一碗，入雄黃，麝香，二物隨意看多少。細研，投藍中，以點咬處。若是毒者，即並細服其汁，神異之極也。昔張員外在劍南為張延賞判官，忽被斑蜘蛛咬項上，一宿，咬有二道赤色，細如箸繞項上，從胸前下至心經，兩宿頭面腫疼，如數升碗大，肚漸腫，幾至不救。張相素重荐，因出家資五百千，並荐家財，又數百千。募能療者，忽一人應召云，可治。張相初甚不信，欲驗其方，遂令目前合藥。其人云不惜方，當療人性命耳，遂取大藍汁一瓷碗，取蜘蛛投之藍汁，良久方出。得汁中甚困，不能動，又別搗藍汁，加麝香末，更取蜘蛛投之，至汁而死，又更取藍汁，麝香，複加雄黃，和之，更取一蜘蛛投汁中，隨化為水。張相及諸人甚異之，遂令點於咬處，兩日內悉平愈，但咬處作小瘡，痂落如舊。

《經驗方》，治蜘蛛咬，遍身生絲。

羊乳一升飲之，貞元十年，崔員外從質云，目擊有人被蜘蛛咬。腹大如孕婦，其家棄之。

乞食於道，有僧遇之，教飲羊乳，未幾日而平。

又方，治蚯蚓咬。

濃作鹽湯，浸身數遍，瘥。浙西軍將張韶，為此蟲所咬，其形大如風，眉須皆落。每夕蚯蚓鳴於體，有僧教以此方，愈。

又方，治蚯蚓蟲咬，其形如大風，眉須皆落。

以鍛石水，浸身，亦良。

《聖惠方》，主蛐 咬人方。

以雞屎，敷之。

又方，治螻蛄咬人。

用鍛石，醋和，塗之。

《廣利方》，治蠶咬人。

麝香，細研，蜜調，塗之，瘥。

《千金方》，治蠷 尿瘡。

楝樹枝皮，燒灰，和豬膏，敷之。

又方，杵豉，敷之。

又方，以酢和粉，敷之。

又方，治蠷 蟲，尿人影。

著處，便令人體病瘡，其狀如粟粒累累，一聚慘痛。身中忽有處燥痛如芒刺，亦如刺蟲所螫後，細瘡 作叢。如茱萸子狀也，四畔赤，中央有白膿如黍粟。亦令人皮急，舉身惡寒壯熱，極者連起，竟腰脊胸也。

治之法，初得磨犀角，塗之，止。

《博物志》，治蠷 蟲溺人影，亦，隨所著作瘡。

以雞腸草汁，敷之，良。

《外台秘要》，治蠷 尿瘡，繞身匝，即死。

以燕巢中土，豬脂，苦酒和，敷之。

又方，治蠷 尿瘡。

燒鹿角末，以苦酒調，塗之。

錢相公方，療蠷 尿瘡黃水出。

嚼梨葉，敷之，乾即易。

《勝金方》，治蠷 尿人成瘡。初如糝粟，漸大如豆，更大如火烙漿，疼痛至甚。宜速用草茶，並蠟茶俱可，以生油調，敷上，其痛藥至立止，妙。

《聖惠方》，治惡蟲咬人。

用紫草油，塗之。

又方，以酥和鹽，敷之。

治卒蠆螫方第六十

以玉壺丸，及五蛄丸，塗其上，並得。

其方，在備急丸散方中。

又方，取屋 下土，水和，敷之。

治卒蜂所螫方第六十一

蜂螫人。

取人尿洗之。

又方， 樹桑樹白汁，塗之，並佳。

又方，刮齒垢塗之，又破蜘蛛，又煮蜂房，塗之。燒牛角灰，苦酒和，塗之。又斷葫，揩之，又嚼青蒿，敷之。

附方 《千金方》，治蜂螫人。

用露蜂房，末，豬膏和，敷之。楊氏《產乳》，蜂房煎湯洗，亦得。

又《外台秘要》， 薄荷，貼之，瘥。

又《聖惠方》，以酥，敷之愈。

沈存中筆談云，處士劉湯，隱居王屋山。嘗於齋中，見一大蜂竄，為蛛網絲縛之。為蜂所螫墜地，俄頃，蛛鼓腹欲裂，徐徐行，入草嚙芋梗，微破。以瘡就嚙處，磨之，良久，腹漸消。輕躁如故，自後人有為蜂螫者， 芋梗，敷之，則愈。

治卒蠍所螫方第六十二

蠍螫人。

溫湯漬之。

又方， 馬莧，大蒜，又嚼乾薑，塗之，佳。姚方以冷水漬螫處，即不痛。水微暖，便痛，

即易水。又以冷漬故布，拓之，數易。

新效方，蜀葵花，石榴花，艾心分等。並五月五日，午時，取陰乾，合搗，和水塗之螫處，立定。二花未定，又鬼針草， 汁敷之，立瘥。

又黃丹醋塗之，又生烏頭末，唾敷之。嚼乾薑，塗之。又麝，封之，溫酒，漬之，即愈。

附方 孫真人《食忌》，主蠍螫。

以礬石一兩，醋半升，煎之。投礬末於醋中，浸螫處。

又《勝金方》，烏頭末少許，頭醋調，敷之。

又錢相公《箧中方》，取半夏以水研，塗之，立止。

又《食醫心鏡》，以醋磨附子，敷之。

又《經驗方》，以驢耳垢敷之，瘥。崔給事傳。

《廣利方》，治蠍螫人，痛不止方。

楮樹白汁，塗之，立瘥。

治中蠱毒方第六十三

葛氏方，療蠱毒下血方。

羚羊皮方三寸，得敗鼓亦好。 荷葉，苦參，黃連，當歸各二兩，水七升，煮二升，分三服。一方加犀角，升麻各三兩，無 荷根，用茜根四兩代之，佳。

人有養蓄蠱以病患，其診法。

中蠱令人心腹切痛，如有物嚙，或吐下血，不即療之。食人五臟則死矣，欲知蠱與非蠱。

當令病患唾水中，沉者是，浮者非，《短劇》，姚，並同。

欲知蠱毒主姓名方。

取鼓皮少少，燒末飲病患。病患須臾自當呼蠱主姓名，可語便去，則便愈。亦有蛇蜒合作蠱毒著飲食中，使人得瘕病。此一種積年乃死，療之各自有藥，又 荷葉，密著病患臥席下，其病患即自呼蠱主姓名也。

療中蠱毒吐血或下血，皆如爛肝方。

茜草根， 荷根各三兩， 咀，以水四升，煮取二升，去滓。適寒溫頓服，即愈。又自當呼蠱主姓名，茜草即染絳草也。《短劇》，並姚方同也。

又方，巴豆一枚去心皮，熬，豉三粒，釜底墨方寸匕，合搗為三丸。一丸當下毒，不可者，更服一丸，即下。

又方，鹽一升，淳苦酒和，一服立吐，即愈。《短劇》同，支方，苦酒一升，煮令消，服，愈。

又方，取蚯蚓十四枚，以苦酒三升漬之，蚓死。但服其汁，已死者，皆可活。

又方，苦瓠一枚，水二升，煮取一升，服。立即吐，愈。短劇同，支方，用苦酒一升，煮令消服，神驗。

又方，皂莢三梃，炙去皮子，酒五升漬一宿，去滓。分三服，短劇同。

療飲中蠱毒，令人腹內堅痛，面目青黃，淋露骨立。病變無常方，取鐵精搗之，細篩，又別搗，烏雞肝以和之。丸如梧子大，服三丸，甚者不過十日，微者即愈，別有鐵精方。

又方，豬肝一具，蜜一升，共煎之，令熟。分為二十服，秘方《短劇》同，支方分作丸，亦得。

又方，取棗木心，銼，得一斛，著釜中，淹之。令上有三寸水，煮取二斗，澄取清。

微火煎得五升，宿勿食，旦服五合，則吐蠱毒出。《短劇》，姚同之。

又方，雄黃，丹砂，藜蘆各一兩，搗，末，旦以井華水，服一刀圭，當下吐蠱蟲出。

又方，隱 草汁，飲一二升。此草桔梗苗，人皆食之。

治蠱已食下部，肚盡腸穿者。

取長股蝦蟆青背一枚，雞骨，支方，一分燒為灰，合。納下部令深入，《短劇》同，支方屢用大驗，姚方亦同。

又方，以豬膽瀝納下部中，以綿深導內塞之。

又方，五蠱黃丸，最為療蠱之要，其方在備急條中。

複有自然飛蠱，狀如鬼氣者，難。

此諸種得真犀，麝香，雄黃，為良藥，人帶此於身，亦預防之。

姚氏，療中蠱下血如雞肝，出石餘，四臟悉壞，唯心未毀，或鼻破。

待死方。

末桔梗，酒服一匕。日一二，葛氏方也。

支太醫，有十數傳用方。

取馬兜鈴根，搗，末。水服方寸匕，隨吐則出，極神驗。此物苗似葛蔓緣柴生，子似橘子。

凡畏已中蠱，欲服甘草汁。

宜生煮服之，當吐，疾出。若平生，預服防蠱毒者，宜熟炙煮服。即內消不令吐，神驗。

又方，甘草炙，每合咽汁。若因食中蠱反毒，即自吐出，極良。常含咽之，永不慮藥及蠱毒也。

又有解百毒散，在後藥毒條中，亦療方。

桑白汁一合，服之。須臾吐利，蠱出。

席辯刺史傳效二方云，並試用神驗。

斑蝥蟲四枚，去足翅炙，桃皮（五月初五采取），去黑皮陰乾，大戟，凡三物並搗，別篩，取斑蝥一分。桃皮、大戟各二分，合和棗核大，以米清飲服之訖。吐出蠱，一服不瘥，十日更一服，瘥。此蠱洪州最多，老媼解療一人，得縑二十疋。秘方不可傳，其子孫犯法，黃花公若於則為都督，因以得之流傳。老媼不複得縑，席云，已瘥十餘人也。

又方，羚羊皮方寸匕， 荷根四兩，苦參，黃連各二兩，當歸，犀角，升麻各三兩，七物以水九升。煮取三升，分三服，蠱即出。席云，曾與一人服。應時吐蜂兒數升，即瘥，此是姚大夫方。

附方 《千金翼方》，療蠱毒。

以槲木北陰白皮一大握，長五寸，以水三升，煮取一升。空腹分服，即吐蠱出也。

又治蠱毒下血。

皮燒末，水服方寸匕，當吐蠱毒。

《外台秘要》，救急治蠱。

以白鴿毛，糞燒灰，飲和服之。

楊氏《產乳》，療中蠱毒。

生玳瑁，以水磨如濃飲，服一盞，自解。

《聖惠方》，治小兒中蠱，下血欲死。

搗青藍汁，頻頻服半合。

治卒中溪毒方第六十四

姚氏，中水毒秘方。

取水萍曝乾，以酒服方寸匕，瘥止。又云，中水病，手足指冷，即是。若暖非也，其冷或一寸，極或竟指，未過肘膝一寸淺，至於肘膝為劇。

葛氏，水毒中人，一名中溪，一名中洒，一名水病。似射工而無物，其診法。

初得之惡寒，頭微痛，目注疼，心中煩懊，四肢振淅，骨節皆強。筋急，但欲睡，旦醒，暮劇。手逆冷，三日則複生蟲食下瘡，不痛不癢不冷。人覺視之乃知，不即療。過六七日下部膿潰，蟲食五臟，熱極煩毒。注下不禁，八九日，良醫不能療，覺得急，當深視下部。

若有瘡，正赤如截肉者為陽毒，最急。若瘡如蠡魚齒者為陰毒，猶小緩，要皆煞人。不過二十日，欲知是中水毒，當作數升湯，以小蒜五寸。 咀投湯中，莫令大熱。熱即無力，捩去滓，適寒溫以浴。若身體發亦斑紋者，又無異証，當以他病療之也。

病中水毒方。

取梅若桃葉，搗，絞汁三升許，以少水解為飲之。姚云，小兒不能飲，以汁敷乳頭，與之。

又方，常思草，搗絞，飲汁一二升，並以綿染寸中，以導下部，日三過，即瘥。

又方，搗藍青汁，以少水和塗之。頭面身體，令匝。

又方，取梨葉一把，熟搗，以酒一杯和絞，服之，不過三。

又方，取蛇莓草根，搗作末，服之。並以導下部，亦可飲汁一二升，夏月常行。欲入水浴，先以少末投水中流，更無所畏。又辟射工家中，雖以器貯水浴，亦宜少末，投水中，大佳。

今東閑諸山縣，無不病溪毒，春月皆得。亦如傷寒，呼為溪溫，未必是射工輩，亦盡患瘡痢，但寒熱煩疼不解，便致死耳，方家用藥與傷寒溫疾相似，令施其單法。

五加根燒末，酒若漿水飲之。荊葉汁，佳，千金不傳秘之。

又方，密取蓼搗汁，飲一二合，又以塗身令周匝。

取牛膝莖一把，水酒共一杯，漬。絞取汁飲之，日三。雄牛膝，莖紫色者是也。

若下部生瘡，已決洞者。

秫米一升，鹽五升，水一石，煮作糜，坐中，即瘥。

又方，桃皮葉，熟搗水漬令濃，去滓。著盆中坐漬之，有蟲出。

又方，皂莢燒末，綿裹導之，亦佳。又服牡丹方寸匕，日三服。

治卒中射工水弩毒方第六十五

江南有射工毒蟲，一名短狐，一名蜮。常在山間水中，人行及水浴。此蟲口中橫骨角弩，唧以射人形影則病，其診法。

初得或如傷寒，或似中惡，或口不能語，或惡寒熱。四肢拘急，旦可，暮劇。困者三日，齒間血出，不療即死。

其中人有四種，初覺則遍身體視之。其一種正黑如墨子，而繞四邊者人或犯之如刺狀。

其一種作瘡，瘡久即穿陷。一種突起如石之有棱。其一種如火灼人肉， 起作瘡。此種最急，並皆殺人。居溪旁隰地，天大雨，或逐人行潦流。入人家而射人，又當養鵝鴨，亦可以食人，行將純白鵝以辟之。白鴨亦善，帶好生犀角，佳也。

若見身中有此四種瘡處，便急療之。

急周繞遍，去此瘡邊一寸，輒灸一處百壯，瘡亦百壯則瘥。

又方，赤莧莖葉，搗，絞取汁，飲之，以滓敷之。姚云，服七合，日四五服。

又方，葫蒜，令敷以拓瘡上，灸蒜上千壯，瘥。

又方，白雞矢白者二枚，以小餳和調，以塗瘡上。

又方，鼠婦，蟲，豉各七合，巴豆三枚，去心。合豬脂，但以此藥塗之。

又方，取水上浮走豉母蟲一枚，置口中，便瘥。云此蟲正黑，如大豆浮水上相游者。

又方，取皂莢一梴，尺二者，捶碎，苦酒一升，煎如飴，去滓，敷之痛處，瘥。

又方，馬齒莧，搗飲汁一升，滓敷瘡上。日四五遍，則良驗。

又方，升麻，鳥 各二兩，水三升，煮取一升，盡服之。滓敷瘡上，不瘥，更作。姚同，更加犀角二兩。

姚云此蟲含沙射人影便病，欲渡水，先以石投之。口邊角弩發矢，言口息兩角能屈伸。

冬月則蟄。

有一長角橫在口前，弩檐臨其角端，曲如上弩，以氣為矢，用水勢以射人。人中之，便不能語，餘狀如葛氏所說。

治卒中沙虱毒方第六十六

山水間多有沙虱，甚細略不可見，人入水浴，及以水澡浴。此蟲在水中，著人身，及陰天雨行草中，亦著人。便鑽入皮裡，其診法。

初得之皮上正赤，如小豆黍米粟粒，以手摩赤上，痛如刺。三日之後，令百節強，疼痛寒熱，赤上發瘡。此蟲漸入至骨，則殺人，自有山澗浴畢，當以布拭身數遍，以故帛拭之一度，乃敷粉之也。

又療沙虱毒方。

以大蒜十片，著熱灰中，溫之令熱。斷蒜及熱拄瘡上，盡十片，複以艾灸瘡上，七壯則良。

又方，斑蝥二枚，熬。一枚，末，服之。燒一枚，令絕煙，末，以敷瘡上，即瘥。又以射敷之，佳。

又方，生麝香，大蒜，合搗，以羊脂和，著小筒子中，帶之行，今東間水無不有此。浴竟中拭KT KT 如芒毛針刺熟，看見，則以竹葉抄挑去之。

比見嶺南人，初有此者，即以茅葉，茗茗，刮去。及小傷皮則為佳，仍數塗苦苣菜汁，佳。

已深者，針挑取蟲子，正如疥蟲，著爪上映光方見行動也。若挑得，便就上灸三四壯，則蟲死病除。

若覺猶，見是其已太深，便應依土俗作方術，拂出，乃用諸湯藥以浴。皆一二升出都盡乃止，亦依此方並雜治中溪毒及射工法。急救，七日中，宜瘥。不爾，則仍有飛蟲在身中，啖人心臟，便死，慎不可輕。

治卒服藥過劑煩悶方第六十七

服藥過劑，煩悶，及中毒多，煩悶欲死方。

刮東壁土少少，以水一二升和，飲之，良。

又方，於屋 下作坎，方二尺，深三尺，以水七升，灌坎中。以物揚之，令沫出，取一升，飲之，未解更作。

又方，搗藍，取汁服數升，無藍。，只洗青絹，取汁飲，亦得。

服藥失度，心中苦煩方。

飲生葛根汁，大良，無生者，乾葛為末，水服五合，亦可煮服之。

又方，吞雞子黃數枚，即愈。不瘥，更作。

服石藥過劑者。

白鴨屎末，和水調服之，瘥。

又方，大黃三兩，芒硝二兩，生地黃汁五升，煮取三升，分三服，得下，便愈。

若卒服藥，吐不止者。

飲新汲水一升，即止。

若藥中有巴豆下痢不止方。

末乾薑，黃連，服方寸匕，瘥。

又方，煮豆汁一升，服之，瘥。

附方 《外台秘要》，治服藥過劑，及中毒煩悶欲死。

燒犀角末，水服方寸匕。

治卒中諸藥毒救解方第六十八

治食野葛已死方。

以物開口，取雞子三枚，和以吞之，須臾吐野葛出。

又方，溫豬脂一升，飲之。

又方，取生鴨就口斷鴨頭，以血瀝口中，入咽則活。若口不可開者，取大竹筒洞節，以頭注其脅，取 水竹筒中。數易水，須臾口開，則可得下藥。若人多者，兩脅及臍中各與筒，甚佳。

又方，多飲甘草汁，佳。

姚方，中諸毒藥，及野葛已死方。

新小便和人屎，絞取汁一升，頓服。入腹即活，解諸毒，無過此汁。

中鴆毒已死者。

粉三合，水三升，和飲之。口噤，以竹管強開，灌之。

中射 毒。

藍汁，大豆，豬，犬血，並解之。

中野狼毒，毒以藍汁解之。

中野狼葵毒，以葵根汁解之。

中藜蘆毒，以雄黃蔥汁，並可解之。

中躑躅毒，以梔子汁，解之。

中巴豆毒。

黃連，小豆藿汁，大豆汁，並可解之。

中雄黃毒，以防己汁解之。

中蜀椒毒，中蜈蚣毒。

二毒，桑汁煮桑根汁，並解之。

中礬石毒，以大豆汁解之。

中芫花毒，以防風，甘草，桂，並解之。

中半夏毒，以生薑汁，乾薑，並解之。

中附子、烏頭毒，大豆汁，遠志汁，並可解之。

中杏仁毒，以藍子汁，解之。

食金已死者，取雞屎半升，水淋得一升，飲之，日三服。

又方，吞水銀二兩，即裹金出，少者一兩亦足。

姚云，一服一兩，三度服之。扶坐與之，令入腹即活。

又方，鴨血及雞子，亦解之。

今取一種，而兼解眾毒。

取甘草， 咀濃煮，多飲其汁，並多食蔥中涕，並佳。

又方，煮大豆，令涌，多飲其汁，無大豆，豉，亦佳。

又方，藍青藍子，亦通解諸毒，常預蓄之。

又方，煮薺，令濃飲一二升，秘方。卒無可煮嚼食之，亦可作散，服之。此藥在諸藥中，諸藥則皆驗。

又方，凡煮此藥汁解毒者，不可熱飲之，諸毒得熱更甚，宜使小冷，為良。

席辯刺史云，嶺南俚人，毒皆因食得之。多不即覺，漸不能食，或更心中漸脹，並背急悶，先寒似瘴。

微覺，即急取一片白銀含之，一宿銀變色，即是藥也。銀青是藍藥，銀黃赤是KT 藥，久久者，入眼，眼或青，或黃赤，青是藍藥，黃赤是□藥，俚人有解療者，畏人得知，在外預言三百牛藥，或云三百兩銀藥。余久任，以首領親狎，知其藥常用，俚人不識本草，乃妄言之，其方並如後也。

初得俚人毒藥且令定方。

生薑四兩，甘草三兩，炙，切，以水六升，煮取二升。旦服三服，服訖，然後覓藥療之。

療方。

常山四兩，切，白鹽四錢，以水一斗，漬一宿，以月盡日漬。月一日五更，以土釜煮，勿令奴婢雞犬見，煮取二升。旦分再服，服了，少時即吐，以銅器貯取。若青色以杖舉五尺不斷者，即藥未盡，二日後更一劑。席辯曾飲酒得藥，月餘始覺，首領梁墳，將土常山，與為呼為一百頭牛藥，服之。即瘥，瘥後二十日，慎毒食，唯有煮飯食之，前後得瘥，凡九人。

又方，黃藤十兩，嶺南皆有，切，以水一斗，煮取二升，分三服，服訖。毒藥內消，若防己俚人藥，常服此藤，縱得自然不發。席云，常服之，利小便，亦療數人。

又方，都淋藤十兩，嶺南皆有，土人悉知，俚人呼為三百兩銀。其葉細長，有三尺微藤，生切，以水一斗，和酒二升，煮取三升，分三服，服訖。毒藥並逐小便出，十日慎毒食，不瘥，更服之，即愈。

又方，乾藍實四兩，白花藤四兩，出 州者上，不得取野葛同生者。切，以水七升，酒一升，煮取半升，空腹頓服之。少悶勿怪，單乾藍，搗末，頓服之，亦瘥。

又療腹內諸毒。

都淋藤二兩，長三寸，並細銼，酒三升，合安罌中，密封。以糠火燒四邊，燒令三沸，待冷出，溫服。常令有酒色，亦無所忌，大效。

若不獲已食俚人食者。

先取甘草一寸，炙之，後熟嚼吞之。若食著毒藥即吐，便是得藥。依前法療之，席辯云，常囊貯甘草十片以自防。

附方 《勝金方》，治一切毒。

以膽子礬，為末。用糯米糊，丸如雞頭實大，以朱砂衣。常以朱砂養之，冷水化一丸，服，立瘥。

《經驗方》，解藥毒上攻如聖散。

露蜂房，甘草等分，用麩炒令黃色，去麩為末，水二碗，煎至八分一碗，令溫。臨臥頓服，明日取下惡物。

《外台秘要》，治諸藥石後，或熱噤多向冷地臥，又不得食諸熱面酒等方。

五加皮二兩，以水四升，煮取二升半，候石發之時，便服。未定，更服。

孫思邈論云，有人中烏頭、巴豆毒。

甘草入腹即定方，稱大豆解百藥毒。嘗試之，不效，乃加甘草為甘豆湯，其效更速。

《梅師方》，蜀椒閉口者有毒，誤食之。便氣欲絕，或下白沫，身體冷。急煎桂汁服之，多飲冷水一二升。忽食飲吐漿，煎濃豉汁服之。

《聖惠方》，治硫黃，忽發氣悶，用羊血服一合，效。

又方，治射 在諸肉中有毒，及漏脯毒。

用貝子末，水調半錢，服效，或食面 毒，亦同用。

《初虞世方》，治藥毒秘效。

巴豆去皮，不出油，馬牙硝，等分。合研成膏，冷水化一彈子許，服，瘥。

治食中諸毒方第六十九

蜀椒閉口者有毒，戟人咽，氣便欲絕，又令人吐白沫。

多飲桂汁若冷水一二升，及多食大蒜，即便愈。慎不可飲熱，殺人，比見在中椒毒，含蒜及薺，瘥。

鉤吻葉與芥相似，誤食之殺人方。

薺 八兩，水六升，煮取三升，服五合。日五服，又云此非鉤吻。

食諸菜中毒，發狂煩悶，吐下欲死方。

取雞屎燒末，服方寸匕。不解更服，又煮葛根飲汁。

莨菪毒，煮甘草汁，搗藍汁飲，並良。

苦瓠毒，煮黍穰令濃，飲汁數升，佳。

食馬肝中毒。

取母鼠屎二七枚，兩頭尖者是，水和飲之。未解者，更作。

食六畜鳥獸。

頭垢一錢匕，《短劇》云，起死人。又飲豉汁數升良。

凡物肝臟自不可輕啖，自死者。彌勿食之，生食肝中毒。

搗附子末，服一刀圭，日三服。

肉有箭毒，以藍汁大豆，解射 毒。

食鬱肉，謂在蜜器中，經宿者，及漏脯，茅屋汁沾脯。為漏脯，此前並有毒。

燒人屎，末，酒服方寸匕。

又方，搗薤汁服二三升，各連取，以少水和之。

食黍米中藏脯中毒方。

此是郁脯，煮大豆一沸，飲汁數升，即解。兼解諸肉，漏毒。

食自死六畜諸肉中毒方。

黃柏末，服方寸匕。未解者，數服。

六畜自死，皆是遭疫。有毒，食之洞下，亦致堅積，並宜以痢丸下之。

食魚中毒。

濃煮橘皮飲汁，《短劇》云，冬瓜汁，最驗。

食豬肉過冷不消，必成蟲症，下之方。

大黃，朴硝各一兩，芒硝亦佳。煮取一升，盡服之。若不消，並皮研杏子湯三升，和，三服。吐出，神驗。

食牛肉中毒，煮甘草，飲汁一二升。

食馬肉，洞下欲死者。

豉二百粒，杏子二十枚， 咀，蒸之。五升飯下，熟，合搗之，再朝服，令盡。

此牛馬，皆謂病死者耳。

食鱸魚肝，及 魚中毒。

銼蘆根，煮，汁飲一二升，良。

解毒，濃煮香蘇，飲汁一升。

飲食不知是何毒。

依前，甘草，薺，通療此毒，皆可以救之。

食菹菜誤吞水蛭，蛭啖臟血，腸痛漸黃瘦者。飲牛羊熱血一二升許，經一宿，便暖。豬脂一升，飲之，便下蛭。

食菌遇毒死方。

絞人屎汁，飲一升，即活。服諸吐痢丸，亦佳，又掘地作土漿，服二三升，則良。

誤食野芋，欲死，療同菌法。

凡種芋三年不取，亦成野芋，即殺人也。

附方 《梅師方》，治飲食中毒魚肉菜等。

苦參三兩，以苦酒一升，煎三五沸，去滓。服之，吐出，即愈。或取煮犀角汁一升，亦佳。

又方，治食狗肉不消，心下堅，或腹脹，口乾，發熱，妄語，煮蘆根飲之。

又方，杏仁一升去皮，水三升，煎沸，去滓取汁，為三服，下肉為度。

《金匱》方，治食蟹中毒。

紫蘇煮汁，飲之三升，以子汁飲之。亦治，凡蟹未經霜多毒。

又《聖惠方》，以生藕汁，或煮乾蒜汁，或冬瓜汁，並佳。

又方，治雉肉作，食之吐下。

用生犀角末，方寸匕，新汲水調下，即瘥。

唐崔魏公云，鉉夜暴亡，有梁新聞之，乃診之曰食毒，仆曰：常好食竹雞，竹雞多食半夏苗，必是半夏毒。命生薑擂汁，折齒而灌之，活。

《金匱》方，春秋二時，龍帶精入芹菜中，人遇食之為病。發時手青肚滿，痛不可忍，作蛟龍病，服硬糖三二升。

日二度，吐出如蜥蜴三二個，便瘥。

《明皇雜錄》云，有黃門奉使交廣回，周顧謂曰，此人腹中有蛟龍。上驚，問黃門曰，卿有疾否，曰，臣馳馬大庾嶺，時當大熱，困且渴，遂飲水。覺腹中堅痞如杯，周遂以硝石，及雄黃，煮服之。立吐一物，長數寸，大如指，視之鱗甲具，投之水中。俄頃長

數尺，複以苦酒沃之。如故，以器覆之，明日已生一龍矣。上甚訝之。

治防避飲食諸毒方第七十

雜鳥獸他物諸忌法。

白羊，不可雜雄雞。 羊肝，不可合烏梅及椒食。 豬肉，不可雜羊肝。 牛腸，不可合犬肉。 雄雞肉，不可合生蔥菜。 雞鴨肉，不可合蒜及李子，鱉肉等。 生肝投地，塵芥不著者，不可食。 暴脯不肯燥，及火炙不動，並見水而動，並勿食。 鳥獸自死，口不開者，不可食。

水中魚物諸忌。

魚頭，有正白連諸脊上，不可食。 魚無腸膽，及頭無，勿食。 魚，不合烏雞肉食。 生魚目赤，不可作膾。 魚，勿合小豆藿。 青魚，不可合生胡荽。鱉目凹者，不可食。鱉肉，不可合雞鴨子，及赤莧菜食之。 妊娠者不可食 魚。

雜果菜諸忌。

李子，不可合雞子，及臨水食之。 五月五日，不可食生菜。 病患，不可食生胡芥菜。

妊娠勿食桑椹，並鴨子。 巴豆藿，羹半夏，菖蒲，羊肉，細辛，桔梗，忌菜。 甘草，忌菘菜。 牡丹，忌胡荽。 常山，忌蔥。 黃連，桔梗，忌豬肉，茯苓，忌大醋。 天門冬，忌鯉魚。

附方 《食醫心鏡》，黃帝云，食甜瓜竟食鹽，成霍亂。

孫真人《食忌》，蒼耳，合豬肉食害人。又云，九月勿食被霜瓜。食之，令人成反胃病。

治卒飲酒大醉諸病方第七十一

大醉恐腹腸爛。

作湯於大器中，以漬之，冷複易。

大醉不可安臥，常令搖動轉側。又當風席地，及水洗，飲水，最忌於交接也。

飲醉，頭痛方。

刮生竹皮五兩，水八升，煮取五升，去滓。然後合納雞子五枚，攪調，更煮再沸，二三升，服盡。

飲，後，下痢不止。

煮龍骨飲之，亦可末服。

連月飲，酒，喉咽爛，舌上生瘡。

搗大麻子一升，末黃柏二兩，以蜜為丸，服之。

飲酒，積熱遂發黃方。

雞子七枚，苦酒漬之。封密器中，納井底二宿，當取各吞二枚，枚漸盡，愈。

大醉酒，連日煩毒不堪方。

蔓荊菜，並少米熟煮，去滓。冷之，便飲，則良。

又方，生葛根汁一二升，乾葛，煮飲，亦得。

欲使難醉，醉則不損人方。

搗柏子仁，麻子仁各二合，一服之，乃以飲酒多二倍。

又方，葛花，並小豆花子，末為散，服三二匕。又時進葛根飲，枇杷葉飲，並以雜者乾蒲，麻子等。皆使飲，而不病患，胡麻亦煞酒，先食鹽一匕，後則飲酒，亦倍。

附方 《外台秘要》，治酒醉不醒。

九月九日真菊花，末，飲服方寸匕。

又方，斷酒用驢駒衣，燒灰，酒服之。

又方，鷓 糞灰，水服方寸匕。

《聖惠方》，治酒毒或醉昏悶煩渴要易醒方。

取柑皮二兩，焙乾為末，以三錢匕。水一中盞，煎三五沸，入鹽，如茶法服，妙。

又方，治酒醉不醒。

用菘菜子二合，細研，井花水一盞，調為二服。

《千金方》，斷酒法。

以酒七升著瓶中，朱砂半兩，細研，著酒中。緊閉塞瓶口，安豬圈中，任豬搖動，經七日，頓飲之。

又方，正月一日，酒五升，淋碓頭杵下，取飲。

又方，治酒病。

豉，蔥白各半升，水二升，煮取一升，頓服。